

Isozid[®]-H

farblos/gefärbt

alkoholische Lösung zur Hautdesinfektion

Wirkstoffe: Hexetidin, Isopropanol, n-Propanol

In bewährter Qualität zur

Desinfektion der Haut vor Infektionen, Impfungen, Inzisionen, Punktionen und Operationen.

Wirkungsbereich



wirksam gegen behüllte Viren¹
(z.B. Hepatitis B & C, HIV, SARS-CoV-2)

Die bakterizide Wirkung erfasst grampositive und gramnegative Keime. Zudem besitzt Isozid-H **fungizide** und **begrenzt viruzide Eigenschaften.**¹

Packungsgröße und Kassenstatus

	100 ml	500 ml*	10 x 500 ml*
Isozid [®] -H farblos			✓
Isozid [®] -H gefärbt**	-	✓	✓

* Pumpspender für genaue Dosierung erhältlich

** Ideal wenn aus Sicherheitsgründen eine optische Kontrolle der desinfizierten Hautpartien erwünscht ist

ÖGHMP-geprüft²



Isozid-H farblos - alkoholische Lösung zur Hautdesinfektion; Isozid-H gefärbt - alkoholische Lösung zur Hautdesinfektion: Zusammensetzung:

1 ml enthält 1 mg Hexetidin, 314 mg 2-Propanol, 281 mg 1-Propanol. Gesamtalkoholgehalt 75 Vol%. Hilfsstoffe (farblos): Milchsäure, Glycerin, Wasser. Hilfsstoffe (gefärbt): Milchsäure, Glycerin, Wasser, Gelborange S (E110).

Anwendungsgebiete: *Farblos:* Desinfektion der Haut vor Injektionen, Impfungen, Inzisionen, Punktionen und Operationen, sofern nicht zur Markierung Isozid-H gefärbt vorgezogen wird. *Gefärbt:* Desinfektion der Haut vor Injektionen, Impfungen, Inzisionen, Punktionen und Operationen (wenn aus Sicherheitsgründen eine optische Kontrolle der desinfizierten Hautpartien erwünscht ist).

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile. **Pharmakotherapeutische Gruppe:** Sonstige Antiseptika und Desinfektionsmittel. ATC-Gruppe: D08AX53. **Packungsgrößen:** *Farblos:* 15 ml, 100 ml, 500 ml, 5000 ml (in 10 Flaschen à 500 ml). *Gefärbt:* 500 ml, 5000 ml (in 10 Flaschen à 500 ml).

Abgabe: Rezeptfrei, apothekenpflichtig. **Zulassungsinhaber:** Gebro Pharma GmbH, Fieberbrunn. **Stand der Fachkurzinformation:** September 2019. Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit und Nebenwirkungen sowie Gewöhnungseffekten entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

1 Bei einer Einwirkdauer von 60 Sekunden wirksam. Fachinformation Isozid-H farblos, gefärbt (Stand der Information 05 2021)

2 Expertisen 95/4, 95/5, 95/6, 95/7; Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion

Stand: Mai 2021



farblos 100 ml, 500 ml

GPB.ISO 210501